



Las Vacunas

Las vacunas, son gérmenes -o toxinas producidas por ellos- que han sido manipulados para que no puedan ocasionar enfermedad pero a la vez mantengan su capacidad de ser reconocidos por el sistema defensivo. Con su administración, el organismo produce anticuerpos que lo protegen de igual modo que si hubiera sufrido la enfermedad, aunque dependiendo de la vacuna y de la edad a que se aplica, pueden ser necesarias varias dosis para conseguirlo.



CALENDARIO DE VACUNAS

Aunque las autoridades sanitarias de cada país deciden su propio calendario, adaptándolo a sus necesidades y recursos, las diferencias entre comunidades autónomas son mínimas y tienden a desaparecer. Sin embargo, la aparición de nuevas vacunas y las variaciones epidemiológicas llevan a introducir casi continuamente cambios, de manera que ninguno puede considerarse definitivo.

Las vacunas DTP y HiB se suelen administrar en una misma inyección, y la de la Polio es por vía oral, pero aún así, el bebé debería recibir tres pinchazos (DTP+Hib, MeC y VHB) en cada tanda, por lo que muchos pediatras prefieren dejar el tercero para el mes siguiente.

Actualmente se recomienda no inyectar en las nalgas, sino en el muslo (y en el brazo en los mayores), porque el efecto de las vacunas es mayor, y además se evita el riesgo de lesionar el nervio ciático.

2 meses	4 meses	6 meses	12-15 meses	15-18 meses	4 años	4-6 años	14-16 años
DTP	DTP	DTP		DTP		DTP	Td
HiB	HiB	HiB					
Po	Po	Po		Po		Po	
Mec	Mec	Mec					
VHB	VHB	VHB					
			SRP		SRP		

DTP = Difteria - Tétanos - Pertussis (tos ferina)
 HiB = Hemophilus influenzae tipo B
 Po = Poliomiélitis
 MeC = Meningitis C
 VHB = Virus de Hepatitis B
 SRP = Sarampión - Rubéola - Parotiditis (paperas)
 Td = Tétanos - Difteria

Estas son las vacunas obligatorias. Aunque hay dos más muy recomendadas, pero que no entran en la seguridad social que son

*El PREVENAR (Por el momento, sólo es financiada por el Sistema Nacional de Salud en niños con inmunodeficiencias o enfermedades que les hacen particularmente susceptibles de sufrir estas infecciones, pero con toda probabilidad, cuando descienda su elevado coste (cerca de 80 Euros por dosis), se incorporará al calendario sistemático que debiera administrarse ya a los 2, 4 y 6 meses, con una cuarta dosis de refuerzo al cumplir el año., en el caso de adopción dependiendo de la edad del menor, el pediatra les pondrá una o dos dosis

* La de la varicela, que cuando se incorpore se pondrá alrededor de los 15 meses

Revacunación

Hay estudios que demuestran protección insuficiente frente a las vacunas supuestamente administradas en la mayoría de los niños adoptados en China, normalmente el pediatra aconseja la revacunación, la mayoría de familias que conocemos así lo han hecho y no han tenido ningún problema, Es un tema de pediatra y familia por lo que no lo vamos a valorar más

Consejos post-vacuna

Después de cada vacuna correspondiente es aconsejable dar al menor la dosis de Dalsy correspondiente a la edad y de nuevo otra dosis a las 12 horas de la vacuna, la reacción de cada criatura a las vacunas es muy distinta, los hay que ni se enteran y los hay que pasan 24 horas muy intranquilos y con algo de temperatura, no os preocupéis, es normal